

Circinaria contorta (Hoffm.) A. Nordin, Savi? & Tibell

Circinaria contorta (Hoffm.) A. Nordin, Savi? & Tibell

Thallus schollig bis areoliert, grau bis oliv, oft weißlich bereift. Vorlager undeutlich, Lager ohne Sorale. Apothecien schwarz, aber weißlich bereift und eingesenkt in Lager. Epihymenium dunkel grün. Sporen hyalin, breitellipsoid bis fast kugelig, 2-6/Ascus, 1-zellig, 20-30 x 15-25 µm. Chemie: K-, C-, KC-, P-

Namensänderung zu finden in: ***Phylogeny and taxonomy of Aspicilia and Megasporaceae May 2010 Mycologia 102(6):1339-49***

Literatur

- Schumm, Felix: Kalkflechten der Schwäbischen Alb - ein mikroskopisch anatomischer Atlas, S. 33, ISBN 978-3-8448-7365-8

Mycobank

[Circinaria contorta \(Hoffm.\) A. Nordin, Savi? & Tibell, Mycologia 102 \(6\): 1341 \(2010\) \[MB#518052\]](#)
[Aspicilia contorta \(Hoffm.\) Körb., Systema lichenum Germaniae: 166 \(1855\) \[MB#118883\]](#)